

**Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Pertudoron® 1 und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Pertudoron® 1 beachten?
3. Wie ist Pertudoron® 1 einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Pertudoron® 1 aufzubewahren?



Mischung

Zusammensetzung

10 g (= 10,7 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Belladonna Dil. D3 1 g / China, ethanol. Decoctum Dil. D3 1 g / Coccus cacti Dil. D3 1 g / Drosera Dil. D1 0,5 g / Ipecacuanha, ethanol. Decoctum Dil. D3 1 g / Mephitis putorius (HAB 34) Dil. D5 (HAB, V. 5a, Lösung D2 mit Ethanol 86 Gew.-%) 1 g / Veratrum album, Rhizoma, ethanol. Decoctum Dil. D3 (HAB, V. 19f, Ø mit Ethanol 62 Gew.-%) 1 g.

Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 Gew.-%, Gereinigtes Wasser.

Pertudoron® 1 ist in Packungen mit 20 ml Mischung erhältlich.

1. Was ist Pertudoron® 1 und wofür wird es angewendet?

Pertudoron® 1 ist ein anthroposophisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemwege von: Weleda AG, Postfach 1309 / 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-424, E-Mail: dialog@weleda.de

Anwendungsgebiete

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten Keuchhusten, Krampfhusten, spastische Bronchitis.

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Medikamente. Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Pertudoron® 1 beachten?

Pertudoron® 1 soll nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich gegen Chinin sind.

Schwangerschaft und Stillzeit

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Wie alle Arzneimittel sollte Pertudoron® 1 in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von Pertudoron® 1

Pertudoron® 1 enthält 47 Vol.-% Alkohol.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. Wie ist Pertudoron® 1 einzunehmen?

Nehmen Sie Pertudoron® 1 immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Pertudoron® 1 wird mit Wasser verdünnt eingenommen.

In der Regel erfolgt die Einnahme im Wechsel mit Pertudoron® 2 und zwar entsprechend dem Alter und dem Krankheitsstadium in unterschiedlicher Menge und Häufigkeit.

	Einzel-dosis	Häufigkeit im <u>akuten Stadium</u> im Wechsel mit Pertudoron® 2	Häufigkeit <u>nach</u> fortschreitender <u>Besserung</u>
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren	5 - 10 Tropfen	stündlich	2 - 3 mal täglich
Schulkinder von 6 - 12 Jahren	5 Tropfen	stündlich	2 - 3 mal täglich
Kleinkinder von 1 - 5 Jahren	5 Tropfen	alle 2 Stunden	2 - 3 mal täglich
Säuglinge im 1. Lebensjahr	3 Tropfen	alle 3 Stunden	2 - 3 mal täglich

Dauer der Anwendung:

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb von 2 - 5 Tagen keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen.

Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

Wenn Sie die Einnahme von Pertudoron® 1 vergessen haben: Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Pertudoron® 1 Nebenwirkungen haben.

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

5. Wie ist Pertudoron® 1 aufzubewahren?

Bewahren Sie das Arzneimittel so auf, dass es für Kinder nicht zugänglich ist.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen: Es gibt keine besonderen Anforderungen an die Aufbewahrung.

Stand der Information: Oktober 2005