IbuHEXAL® akut 400 mg Filmtabletten

Bei Fieber und Schmerzen*

IbuHEXAL® akut 400 mg Filmtabletten

Schmerzmittel

- Schnell
- Entzündungshemmend
- Bei leichten bis mäßig starken Schmerzen & Fieber

Wirkt schnell bei Schmerzen und Fieber*

Akute Schmerzen sind lästig und treten grundsätzlich dann auf, wenn man sie überhaupt nicht gebrauchen kann. Sie sind jedoch lebensnotwendige Signale des Körpers, die uns vor Gefahren schützen oder Anzeichen für ernsthafte Erkrankungen sein können. Werden die Ursachen für akute Schmerzen behandelt, klingen sie meist innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen ab. In diesem Zeitraum können spezielle Medikamente helfen, diese Schmerzen zu lindern.

IbuHEXAL® akut 400 mg Filmtabletten mit dem bewährten Wirkstoff Ibuprofen wirkt schnell und zuverlässig bei leichten bis mäßig starken Kopfschmerzen, Zahnschmerzen und Regelschmerzen. Darüber hinaus kann das Arzneimittel auch zur Fiebersenkung eingesetzt werden.

** Leichte bis mäßig starke Schmerzen, z. B. Kopf-, Zahn- und Regelschmerzen*

Mit dem bewährten Wirkstoff Ibuprofen

IbuHEXAL® akut 400 mg Filmtabletten enthalten den bewährten Wirkstoff Ibuprofen. Der Inhaltsstoff verfügt nicht nur über schmerzstillende und fiebersenkende Eigenschaften, sondern wirkt gleichzeitig entzündungshemmend. Das Wirkprinzip basiert auf der Hemmung sogenannter Prostaglandine, die an der Entstehung von Fieber, Schmerzen und entzündlichen Prozessen beteiligt sind. Werden die körpereigenen Botenstoffe nicht mehr gebildet, bleibt das Schmerzempfinden aus. Der Wirkstoff kann bei altersgerechter Dosierung auch Kindern ab 6 Jahren verabreicht werden.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen als Anfangsdosis ½ oder 1 Filmtablette IbuHEXAL® akut 400 mg Filmtabletten unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit (z.B. einem Glas Wasser) ein. Bei Bedarf kann nach mindestens 6 Stunden eine weitere Tablette eingenommen werden. Die vom Alter abhängige Gesamtdosis darf innerhalb von 24 Stunden jedoch nicht überschritten werden. Die Einnahme sollte nicht auf nüchternen Magen erfolgen, bei einem empfindlichen Magen empfiehlt sich die Einnahme während der Mahlzeiten. Das Arzneimittel ist zur kurzzeitigen Anwendung bestimmt. Sollten sich die Beschwerden innerhalb von vier Tagen nicht bessern oder sogar verschlimmern, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf.

ALTER	KÖRPERGEWICHT	EINZELDOSIS	MAX. TAGESDOSIS
6–9 Jahre	20 kg–29 kg	½ Filmtablette (entsprechend 200 mg Ibuprofen)	1½ Filmtabletten (entsprechend 600 mg Ibuprofen)
10–12 Jahre	30 kg–39 kg	½ Filmtablette (entsprechend 200 mg Ibuprofen)	2 Filmtabletten (entsprechend 800 mg Ibuprofen)
Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene	ab 40 kg	½-1 Filmtabletten (entsprechend 200–400 mg Ibuprofen)	3 Filmtabletten (entsprechend 1200 mg Ibuprofen)

BEI KOPFSCHMERZEN

Kopfschmerzen treten häufig wie aus dem Nichts auf und machen ein konzentriertes Arbeiten zunichte. IbuHEXAL® akut 400 mg Filmtabletten mit Ibuprofen kann leichte bis mäßig starke Kopfschmerzen lindern.

KOPF-, GLIEDERSCHMERZEN UND FIEBER

Bei Erkältungskrankheiten treten häufig auch Kopf- und Gliederschmerzen sowie Fieber auf. IbuHEXAL® akut 400 mg Filmtabletten lindert den Schmerz und wirkt gleichzeitig fiebersenkend.

FÜR KINDER AB 6 JAHREN

Bei leichten bis mäßig starken Schmerzen und Fieber können IbuHEXAL® akut 400 mg Filmtabletten bereits Kindern ab 6 Jahren verabreicht werden. Die Filmtabletten sind teilbar und können somit altersgerecht dosiert werden.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN:

Welche Bestandteile sind in IbuHEXAL® akut 400 mg enthalten?
1 Filmtablette enthält 400 mg Ibuprofen. Sonstige Bestandteile sind mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Hypromellose, Macrogol 400, Magnesiumstearat, hochdisperses Siliciumdioxid, Talkum und Titandioxid (E 171).

Darf ich nach der Einnahme von IbuHEXAL® akut Auto fahren?
Da es bei der Einnahme von IbuHEXAL® akut 400 mg zu Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Schwindel und Sehstörungen kommen kann, kann die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr sowie zum Bedienen von Maschinen im Einzelfall beeinträchtigt sein. Das gilt besonders in der Kombination mit Alkohol.

Da Sie auf plötzliche Ereignisse eventuell nicht gezielt und schnell genug reagieren können, fahren Sie bei etwaigen Nebenwirkungen nicht selbst mit dem Auto oder anderen Fahrzeugen. Bedienen Sie keine Maschinen und Werkzeuge und arbeiten nicht ohne sicheren Halt.

Kann IbuHEXAL® akut 400 mg in der Stillzeit eingenommen werden?
Vor der Einnahme sollte ein Arzt oder Apotheker um Rat gefragt werden. Der in IbuHEXAL® akut 400 enthaltene Wirkstoff Ibuprofen und seine Abbauprodukte gehen nur in geringen Mengen in die Muttermilch über. Nachteilige Folgen für den Säugling sind bisher nicht bekannt. Bei kurzfristiger Anwendung der empfohlenen Dosis IbuHEXAL® akut 400 mg ist eine Unterbrechung des Stillens deshalb in der Regel nicht erforderlich.

IbuHEXAL® akut 400 mg Filmtabletten. IbuHEXAL® akut 200/- 400 mg Filmtabletten : Wirkstoff: *Ibuprofen.* **Anwendungsgebiete:** *Symptomatische Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen, wie Kopf-, Zahn-, Regelschmerzen, Fieber. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!* **Mat.-Nr.:** *2/51010757* **Stand:** *Februar 2018*
Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

Bildquellen: Istockphoto.com/monkeybusinessimages, Istockphoto.com/Deagreez, Istockphoto.com/tommaso79, Istockphoto.com/monkeybusinessimages