



**Ibu-LysinHEXAL®**

**3-fach Hilfe bei Schmerzen**

**Ibu-Lysin HEXAL®  
684 mg  
Filmtabletten**



**Wirksames Schmerzmittel**

- Wird besonders schnell\* vom Körper aufgenommen
- Langanhaltende Wirkung bis zu 6 Stunden
- Schmerzlindernd und entzündungshemmend
- Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren (20 kg Körpergewicht)

**Die 3-fach Hilfe bei Schmerzen und Fieber**

Kopfschmerzen treten oft ganz plötzlich auf. Wenn der Schädel pocht oder sich wie eingezwängt anfühlt, handelt es sich meist um Spannungskopfschmerzen. Konzentriertes Arbeiten ist nun nicht mehr möglich und selbst alltägliche Aufgaben sind kaum noch zu bewältigen.

Jetzt ist rasche Hilfe gefragt. Mit seinem besonders schnellen\* Wirkeintritt sorgt Ibu-LysinHEXAL® 684 mg nicht nur für die Linderung von Kopfschmerzen, das Arzneimittel wirkt auch langanhaltend bis zu 6 Stunden bei akuter Migräne mit oder ohne Aura sowie leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Regelschmerzen und Zahnweh. Der Wirkstoff Ibuprofen ist zudem für seine anti-entzündlichen und fiebersenkenden Eigenschaften bekannt und hat sich auch zur Behandlung von Schmerzen und Fieber im Zusammenhang mit Erkältungen bewährt.

**Schnelle\* Wirkung**

Ibu-LysinHEXAL® 684 mg Filmtabletten enthalten den seit Jahrzehnten bewährten Wirkstoff Ibuprofen als sehr gut lösliches DL-Lysinsalz. Dieses kann besonders schnell\* vom Körper aufgenommen werden und beschleunigt so den Wirkeintritt. Ibuprofen ist gut erforscht und gehört zu den bekanntesten Arzneimitteln gegen Schmerzen, Entzündungen und Fieber. Der Wirkstoff hemmt die Bildung sogenannter Prostaglandine, die für die Weiterleitung von Entzündungs- und Schmerzsignalen im Körper verantwortlich sind. Leichte bis mäßig starke Schmerzen und Fieber können so langanhaltend bis zu 6 Stunden gelindert werden.

**ANWENDUNGSEMPFEHLUNG FÜR ERWACHSENE:**

Anfangsdosis: Nehmen Sie 200 mg oder 400 mg Ibuprofen ein (½ oder 1 Tablette Ibu-LysinHEXAL® 684 mg). Falls notwendig, nehmen Sie zusätzlich 200 mg oder 400 mg Ibuprofen ein (½ oder 1 Tablette), aber überschreiten Sie nicht die Gesamtdosis von 1200 mg Ibuprofen (3 Tabletten) innerhalb von 24 Stunden. Der Abstand zwischen den einzelnen Dosen sollte nicht weniger als 6 Stunden betragen.

Für Personen mit empfindlichem Magen ist es ratsam, Ibu-LysinHEXAL® 684 mg während der Mahlzeiten einzunehmen. Der Wirkungseintritt kann dadurch etwas verzögert werden. Das Arzneimittel ist zur kurzzeitigen Anwendung bestimmt. Sollten sich die Beschwerden nicht innerhalb von drei Tagen bei Migränekopfschmerzen oder Fieber oder innerhalb von vier Tagen Schmerzbehandlung bessern oder sogar verschlimmern, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

**Dosierung für Kinder ab 20 kg Körpergewicht (etwa 6 Jahre) und Jugendliche:**

KÖRPERGEWICHT	EINZELDOSIS	MAX. TAGESDOSIS
20 kg–29 kg	200 mg (½ Tablette)	600 mg (1 ½ Tabletten)
30 kg–39 kg	200 mg (½ Tablette)	800 mg (2 Tabletten)
40 kg und mehr	200 - 400 mg (½ - 1 Tablette)	1200 mg (3 Tabletten)



**BEI ERKÄLTUNGEN MIT FIEBER**

Erkältungskrankheiten gehen neben Halsschmerzen, Husten und Schnupfen häufig auch mit Beschwerden wie Kopf-, Gliederschmerzen und Fieber einher.

Ibu-LysinHEXAL® 684 mg kann für eine langanhaltende Schmerzlinderung\*\* sorgen und gleichzeitig das Fieber senken.

\* Schneller Wirkeintritt durch DL-Lysinsalz

\*\* Schmerzlinderung bis zu 6 Stunden



**KOPFSCHMERZEN UND MIGRÄNE**

Bei Spannungskopfschmerzen und Migräne ist ein Arzneimittel gefragt, das schnell\* hilft. Dank der Kombination mit Lysin tritt die schmerzlindernde Wirkung des Inhaltsstoffs Ibuprofen besonders rasch ein und kann langanhaltend bis zu 6 Stunden wirken.



**FÜR KINDER AB 6 JAHREN**

Ibu-LysinHEXAL® 684 mg kann bereits Kindern ab 6 Jahren bzw. einem Körpergewicht ab 20 kg zur Behandlung bei Schmerzen und Fieber verabreicht werden. Die Filmtabletten sind teilbar und können somit altersgerecht dosiert werden.

**HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN:**

**Welche Bestandteile sind in Ibu-LysinHEXAL® 684 mg enthalten?**

Der Wirkstoff ist Ibuprofen-DL-Lysin. Jede Filmtablette enthält 684 mg Ibuprofen-DL-Lysin (1:1), das entspricht 400 mg Ibuprofen.

Der Tablettenkern enthält außerdem mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Talkum, hochdisperses Siliciumdioxid und Magnesiumstearat. Im Filmüberzug sind Hypromellose, Macrogol 6000 und Glycerol 85% enthalten.

**Darf ich nach der Einnahme von Ibu-LysinHEXAL® 684 mg Auto fahren?**

Bei der Einnahme von Ibu-LysinHEXAL® 684 mg kann es zu Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Schwindel und Sehstörungen kommen. Die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr sowie zum Bedienen von Maschinen kann deshalb im Einzelfall eingeschränkt sein. Das gilt in verstärktem Maße in der Kombination mit Alkohol.

**Ibu-LysinHEXAL® 684 mg Filmtabletten: Wirkstoff:** Ibuprofen-DL-Lysin (1:1). **Anwendungsgebiete:** Symptomatische Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen sowie Fieber und Schmerzen im Zusammenhang mit Erkältungen. Symptomatische Behandlung der akuten Kopfschmerzphase bei Migräne mit oder ohne Aura. **Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!**  
**Mat.-Nr.:** 2/51011205 **Stand:** Januar 2018  
 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de